

TO ARTER, DER HØRER SAMMEN:

MARKPERLEMORSOMMERFUGL OG AGER-STEDMODERBLOMST



Markperlemorsommerfugl,
vingefang op til 60 mm

MARKPERLEMOR- SOMMERFUGL

(*Speyeria aglaja*)

Markperlemorsommerfugl er en stor dagsommerfugl med et vingefang på op til 60 mm. Den lever, hvor der er mange blomstrende planter som i skovlysninger, på enge og langs kysterne. Den ses typisk om formiddagen, hvor den flyver fra blomst til blomst. Om eftermiddagen ses hanner jage hunner. Hunnen skjuler sig i græsset. Farverne gør den mindre attraktiv for fugle, men den jages af stor gedehams og mosaikguldsmed. Markperlemorsommerfuglen er med i Verdensnaturfondens projekt om opdræt og udsætning på Knudshoved Odde.

KENDETEGN

- **Voksen:** Hannen og hunnen ligner hinanden, hannen er dog lidt mindre. På oversiden er den orange med sorte pletter og striber. På bagsiden er den grøn ved roden og bliver mere gul mod kanten med sølvpletter.
- **Larve:** Larven er sort med store tornvorter. Den har aflange gulorange pletter på ryggen og orangerøde pletter på siden. Den bliver 38-42 mm lang.

FORVEKSLING

I Danmark findes 10 forskellige arter af perlemorsommerfugle, der er svære at kende fra hinanden.



AGER- STEDMODERBLOMST

(*Viola arvensis*)

Ager-stedmoderblomst hører til violfamilien. Arterne i den familie kan krydse med hinanden og derved danne nye versioner af planten, der ser lidt anderledes ud. Derfor kan de enkelte planter være svære at navngive.

Planten er op til 40 cm høj. Den har en spinkel stængel. Bladet er ægformet og rundtakket og har en lang stilk. Der, hvor stilkken går ud fra hovedstænglen, sidder små fingerformede blade, kaldet fodflige. Blomsten har hvidgule kronblade ofte med mørke striber. Vokser på kalkholdige og lerede markjorder. Blomsten pynter fint på kager, men skal ikke spises i store mængder.


LIVSCYK- LUS

Ager-stedmoderblomst er en énarig urt

- Blomstrer fra maj til oktober.
- Den kan bestøve sig selv eller med hjælp fra insekter.
- Frugten er en kapsel med mange spireklar frø indeni, der spredes med vinden, når kapslen modnes og åbner.



Viola arvensis



Et markperlemorsommerfugle-liv

1. Sommerfuglen flyver fra sidst i juni til midt august.
2. Efter parring bærer hunnen æggene, indtil de er modne nok til at blive lagt.
3. De små buddingformede lysegule æg lægges på undersiden af blade fra viol-familien. Gerne på planter, der står køligt.
4. De små larver, der kommer ud af æggene, overvintrer i den visne vegetation til næste forår.
5. Om foråret bider larverne halvmåneformede stykker af violen. Efter et par måneder forpupper den sig i en krum puppe.
6. Puppestadiet varer et par uger, indtil den nye generation kommer på vingerne.